



VOOR DE BEHANDELING

SPIERONTSPANNERS

Je hebt een afspraak gemaakt voor spierontspanners (botuline toxine). Graag lijsten wij voor de start van de behandeling de belangrijkste aandachtspunten voor jou op:

Gebruik bij voorkeur geen ontstekingsremmers (bijvoorbeeld Ibuprofen), aspirine of alcohol gedurende 48u voor de behandeling. Dit verkleint de kans op een bloeding.

Je gebruikt best geen botuline toxine in de volgende omstandigheden:

- Zwangerschap of borstvoeding
- Koorts of ziektegevoel
- Als je jonger bent dan 18 jaar
- Als je allergisch bent voor botuline toxine a of 1 van de bestanddelen van het gebruikte product (dit kan je steeds met je arts bespreken)
- Als je in het te behandelen gebied een permanente filler, infectie, irritatie of kwaadaardigheid hebt.
- Als je lijdt aan bepaalde spierziekten zoals Myasthenia Gravis, Eaton Lambert syndroom en Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS).

GOED OM TE WETEN

Het spierontspannend effect bouwt zich geleidelijk aan op over enkele dagen, is maximaal na 2 weken en duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden (tot 6 maanden indien de spierontspannende behandeling onderhouden wordt).

HEB JE NOG VRAGEN?

Je vindt veel informatie op www.essance.be/spierontspanners/

Je kan jouw vragen ook steeds stellen bij de volgende consultatie. Verder zijn wij steeds bereikbaar via info@essance.be of telefonisch op het nummer 011/93 36 62.

De prijslijst samen met onze acties en kortingen is terug te vinden op www.essance.be/tarieven/.

